

НітроТОП

ЛИСТОВЕ ДОБРИВО, ЯКЕ ОПТИМІЗУЄ ВМІСТ БІЛКА У ЗЕРНІ

Листове добриво, що містить азот з уповільненим вивільненням, магній і сірку. Воно призначене для задоволення потреби в азоті, та довгострокового живлення рослини. Не спричиняє до опіків листя.

Оптимізує вміст білка у зерні, покращує якість урожаю і дозволяє листовій поверхні рослини засвоїти більше азоту, ніж у простій формі карбаміду.

ЧОМУ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ НітроТОП

- ▶ у поєднанні з останнім фунгіцидом він оптимізує формування урожаю і вміст білка у зерні
- ▶ у випадку посушливих умов - гарантує доступність азоту, на відміну від стандартних добрив
- ▶ НітроТОП виступає в якості доповнення, або заміни останнього внесення азотних добрив
- ▶ він забезпечує правильне поєднання азоту, магнію і сірки

Унікальна формула НітроТОП гарантує:

- ▶ значне зменшення втрат азоту через випаровування
- ▶ збільшення здатності всмоктування поживних речовин поверхнею листка
- ▶ краще проникнення добрива і високі властивості налипання
- ▶ добру фізико-хімічну сумісність з більшістю засобів захисту (не вимагає окремого внесення)
- ▶ тривалішу фазу всмоктування поживних речовин поверхнею листка, ніж у випадку звичайного карбаміду

СКЛАД: 300 г/л - N, 33 г/л - MgO, 67 г/л - SO₃

УПАКОВКА: 10, 100, 200, 1000 Л


2^N ФОРМИ ТРИВАЛЕ І ПОСЛІДОВНЕ ЖИВЛЕННЯ
Поєднання 2-х форм азоту гарантує ефективне поглинання листками азоту і його оптимізацію, що дозволяє уникнути утворення кристалів і знижує ризик опіків на листках.




- ▶ можливість змішування з великою кількістю засобів захисту
- ▶ навіть 100 літрів води на гектар без ризику опіків
- ▶ екологічно чистий продукт (мала кількість залишкового азоту після збирання урожаю)

Культура	Доза	Внесення	Період внесення
пшениця	10–20 л/га	1х	від прапорцевого листка до формування колоса
цукровий буряк	10–20 л/га	1–2х	1 - стадія 4-6 листків 2 - 30 днів після першого внесення
соняшник	15–20 л/га	1х	стадія 5-6 листків до фази зірочки
кукурудза	15–20 л/га	1–2х	1 - стадія 4-6 листків 2 - 10-15 днів після першого внесення
озимий ріпак	10 л/га	1–2х	1 - осінь: стадія 4-8 листків
	10 л/га	1–2х	2 - весна: від початку відновлення вегетації до бутонізації


Озимі пшениця і ячмінь




Озимий ріпак




Кукурудза



Цукровий Буряк



Картопля



Соняшник

