

28 КВІТНЯ 2017

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ №3

ГОРОХ

Цього року посів гороху проведено з невеликим запізненням. Але вологи було достатньо і в результаті ми отримали рівномірні сходи.

Коли горох знаходився у фазі сім'ядолі, відбулося різке зниження температури, що призвело до відставання культури у рості і сповільнення розвитку бульбочкових бактерій.

Для того, щоб стимулювати їхню роботу, необхідно внести **сірку у формі SO₃** (2-3 л/га) та **бор і молібден ВМо** (2 л/га), а також інші мікроелементи, які покращать фотосинтез. В результаті цього активізуються бульбочкові бактерії.



Обробіток гербіцидами:

- якщо висота рослини менша 5 см (фаза 3-х листків), потрібно використати гербіциди **Пульсар 40** (0,5-0,7 л/га) + **Стомп** (2 л/га), або **Пульсар** (0,7-1 л/га);
- якщо висота рослини більша 5 см (фаза 5-6 листків) – використовувати **Базагран** або **Базагран М** (2-3 л/га).



Обробіток інсектицидами:

Провести обробку рослин проти смугастого бульбочкового довгоносика (*Sitona*), який пошкоджує нижні листки, а це у свою чергу - відчутно зменшує урожайність. Використовувати можна як піретроїди, так і системні продукти.

