

03 ЛЮТОГО 2017

## ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ

Вже другий рік поспіль через несприятливий осінній період, ситуація по Озимим культурам складається не найкращим чином.

Більшість посівів Пшениці та Ячменю не встигли достатньо розкущитись перед зимою. Фази розвитку яких варіюються від шильця до початку кушення.

### АЗОТ та ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ, Планування врожайності

Наразі, до відновлення вегетації необхідно провести підживлення Азотом та Сіркою у співвідношенні

1:5 для Ріпаку

1:7 для Зернових

При плануванні врожайності необхідно пам'ятати що для формування 1ц зерна, в залежності від сорту чи гібриду, потреба Азоту складає:

- Оз. Пшениця : 2,2 - 3 кг N/ц
- Оз. Ячмінь : 1,8 - 2,3 кг N/ц
- Оз. Ріпак : близько 6,5 кг N/ц

З урахуванням наявного в ґрунті азоту, залишки від культури попередника, рівня осінньої мінералізації та % гумусу  
Забезпечення Сіркою та своєчасне його внесення дозволяє рослині ефективніше використовувати Азот та знижує ризики виникнення дефіциту.

Фото.  
01.03.17



# AGROFLASH

**Не переплутати:**

Нестача Азоту	Пожовтіння старих листків
Нестача Сірки	Пожовтіння молодих листків

## ОЗИМИ ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ Відновлення вегетації

На добре розвинутих посівах для посилення кущення можна використати 0,3 – 0,5 л/га Хлормекват-Хлорид в комбінації з рідкими добривами що містять у своєму складі Марганець



Важливим елементом при відновленні вегетації зернових є Фосфор. В особливості для швидшого формування кореневої системи.

Не випускати з поля зору низькі температури та незбалансований рівень кислотності ґрунту, при яких даний елемент засвоюється лише частково. В цьому випадку бажано позакоренево внести швидкодоступний для рослини Фосфор. Проте при проведенні операції довжина новоутвореної кореневої системи повинна складати 3 см і більше.

На карбонатних ґрунтах трапляються випадки механічного «випирання» рослин з ґрунту. Якщо спостерігається така ситуація, необхідно провести операцію коткування у фазі від 3х листків до середини кущення кільчасто-дискowymi катками.

Якщо ж ґрунт навпаки переущільнений та спостерігається кисневе голодування - варто провести боронування пружинними чи легкими боронами.

## ОЗИМИЙ РІПАК

При відновленні вегетації внести початкову дозу Азоту 80-100 одиниць. Через 2-3 тижні, та в залежності від умов, внести залишкову заплановану кількість. Вся передбачена доза, повинна бути внесена до фази Початку бутонізації. Коренева система ріпаку є досить потужною, і буде здатна діставати елементи з глибших шарів.

Також звернути увагу на застосування Регуляторів росту, в особливості для «вирівнювання» посівів, зважаючи на нерівномірні фази розвитку рослин через нестачу опадів з осені.

## ІНСЕКТИЦИДИ

При підвищенні температур варто розмістити жовті чашки на полі зі сторони домінуючих вітрів і спостерігати за появою Великого ріпакового прихованохоботника. Застосовувати інсектицид через 8 днів після потрапляння перших шкідників до пастки.





ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА:

**ВІКТОР ЮЩУК**

регіональний представник у Тернопільській обл.

**ВІТАЛІЙ ГРИЦІВ**

регіональний представник у Хмельницькій обл. /південь/

**МИКОЛА ДЗЮМАК**

регіональний представник у Хмельницькій обл. /північ/

**ВІКТОР ВАРХОЛЯК**

регіональний представник у Вінницькій обл.

**ВІТАЛІЙ МОРОЗ**

регіональний представник у Київській обл.

**ЄВГЕНІЙ ЩИПИЛОВ**

регіональний представник у Черкаській обл.

**ВІКТОР ЯРМОЛЬЧУК**

регіональний представник у Львівській, Волинській і Рівненській обл.

**ПАВЛО МОТОРНЮК**

регіональний представник у Житомирській обл.

**СКОРОПАД ВІКТОРІЯ**

Регіональний представник у Львівській обл.

**СНІЖОК ЮРІЙ**

Регіональний представник у Рівненській обл.

**ДЕБОПРЕ ОЛЕКСАНДР**

регіональний представник у Хмельницькій обл.

**СКОРОПАД ЯРОСЛАВ**

регіональний представник у Львівській обл.

**ПОСАЦЬКИЙ ОРЕСТ**

регіональний представник в Івано-Франківській обл.

**ТУРЧАК ІВАН**

регіональний представник в Тернопільській обл.

**СОЛТИС АНДРІЙ**

регіональний представник в Тернопільській обл.

**ТУРЧАК ВОЛОДИМИР**

регіональний представник в Тернопільській та Івано-Франківській обл.

**ІЛЬНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР**

регіональний представник у Львівській обл.

**ДМИТРО ГІРИН**

Менеджер по роботі з ключовими клієнтами

**МИКОЛА МАТВІЙЧУК**

менеджер з постачання насіння

регіональний представник у Львівській, Волинській і Рівненській обл.

+38 (050) 376-77-37

[vyuschuk@soufflet.com](mailto:vyuschuk@soufflet.com)

+38 (050) 436-07-09

[vgrytsiv@soufflet.com](mailto:vgrytsiv@soufflet.com)

+38 (050) 376-27-68

[mdzyumak@soufflet.com](mailto:mdzyumak@soufflet.com)

+38 (050) 461-27-99

[vvarkholyak@soufflet.com](mailto:vvarkholyak@soufflet.com)

+38 (050) 376-38-24

[vmoroz@soufflet.com](mailto:vmoroz@soufflet.com)

+38 (050) 376-38-17

[eschipilov@soufflet.com](mailto:eschipilov@soufflet.com)

+38 (050) 376 09 55

[vyarmolchuk@soufflet.com](mailto:vyarmolchuk@soufflet.com)

+38 (050) 436 50 15

[pmotorniuk@soufflet.com](mailto:pmotorniuk@soufflet.com)

+38 (050) 4060834

[vskoropad@soufflet.com](mailto:vskoropad@soufflet.com)

+38 (050) 4368004

[ysnizhok@soufflet.com](mailto:ysnizhok@soufflet.com)

+38 (050) 4060904

[odebopre@soufflet.com](mailto:odebopre@soufflet.com)

+38 (050) 4060937

[y Skoropad@soufflet.com](mailto:y Skoropad@soufflet.com)

+38 (050) 4060864

[oposatskyi@soufflet.com](mailto:oposatskyi@soufflet.com)

+38 (050) 4060899

[iturchak@soufflet.com](mailto:iturchak@soufflet.com)

+38 (050) 4060995

[asoltys@soufflet.com](mailto:asoltys@soufflet.com)

+38 (050) 4061039

[vturchak@soufflet.com](mailto:vturchak@soufflet.com)

+38 (050) 4061229

[oilnytskyi@soufflet.com](mailto:oilnytskyi@soufflet.com)

+38 (050) 498 08 06

[dgiryn@soufflet.com](mailto:dgiryn@soufflet.com)

+38 (050) 376 27 71

[mmatviychuk@soufflet.com](mailto:mmatviychuk@soufflet.com)



soufflet  
AGRO UKRAINE

ТОВ „Суффле Агро Україна“

вул. Острозька, 138, м. Славутич, Хмельницька обл., 30000 e-mail: [sau@soufflet-group.com](mailto:sau@soufflet-group.com) [www.soufflet-agro.com.ua](http://www.soufflet-agro.com.ua)