AGROFLASH

14 КВІТНЯ 2017

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ №2

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

У порівнянні з минулим роком, ячмінь посіяно на 15-25 днів пізніше. Відповідно – його вегетаційний період буде значно коротшим.

Для кращого розвитку кореневої системи, радимо внести мікродобрива на основі фосфору, наприклад – **СерiaСТАРТ** (2 л/га), а також провести **підживлення азотом** у формі **NO_3** у випадку, якщо запланована норма азоту не була внесена до посіву.

На різних полях спостерігається **різна глибина заробки насіння**, що у подальшому вплине на кущення ячменю і його урожайність.

УВАГА:
Потрібно внести **сірку у формі SO_3**, використавши, наприклад, - **НУТРІМАКС** для покращення засвоєння азоту з ґрунту.

На багатьох посівах спостерігається **пошкодження блохою**.

Якщо насіння не було протравлене інсектицидом – потрібно провести обробіток проти блішок піретроїдами, наприклад **Карате Зеон**, **Фастак** або **Децис** (1 л/га).

Обробіток гербіцидами потрібно провести з середини фази кущення, оскільки запізнілий обробіток призводить до зменшення урожайності. **Слідкувати за появою хвороб** – гельмінтоспоріозу і борошнистої роси. У кінці фази кущення, коли рядки «зімкнуться», - провести обробку фунгіцидом. Наприклад – **Тілт Турбо** (1 л/га), **Авіатор** (0,4 – 0,6 л/га), **Рекс + Флексіті** (0,4 – 0,2 л/га) чи ін.

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

Пізні сходи ячменю восени і холодна погода весною перешкоджають нормальному розвитку посівів озимого ячменю.

Для покращення стану та засвоєння ячменем азоту з ґрунту (який був внесений попередньо для відновлення вегетації) потрібно внести **сірку у формі SO_3**.

Якщо посіви озимого ячменю дуже ослаблені – **використання гербіцидів краще відкласти** до покращення їхнього стану і більш сприятливих погодних умов.

Також потрібно слідкувати за появою хвороб і шкідників. **Внести фунгіциди у фазі 29-31**.

Гарно розвинені посіви ячменю швидко проходять фазу кущення і починають вихід у трубку, тому слід не пропустити фази **внесення регуляторів росту**, таких як **Терпал**, **Модус**, **Церон** і **Медакс Топ**.

Для озимого ячменю повні норми регуляторів потрібно розділити на 2 внесення (1: 60% - 2: 40%).

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

Минулої осені **сходи пшениці були отримані надто пізно**. Це призвело до ослабленого стану посівів весною.

Проте, вдале поєднання рідких фосфорних добрив з хлормекват-хлоридом дало можливість пшениці завершити кущення.

Зараз найкращі **посіви пшениці знаходяться вже у фазі виходу в трубку.**

УВАГА:

Необхідно **завершити обробіток посівів пшениці гербіцидами** і звернути увагу на пошкодження посівів блохою. За необхідності **провести обробку інсекцидом.**

Щоб не пропустити фази закладки колосків у колосі (колос – 1 см), необхідно **провести планове підживлення азотом і внести сірку SO_3** (**НУТРІМАКС** 1,5-2,5 л/га) для його кращого засвоєння.

До початку виходу у трубку потрібно **внести основні мікро- та макро-елементи**, які впливають на закладку колосків у колосі (з урахуванням типу ґрунтів) – **фосфор, мідь, цинк, бор, марганець, магній** та ін.

Починаючи з фази 30 до фази 32 потрібно **використовувати регулятори росту** (детальні рекомендації див. у Довіднику з вирощування культур СУФФЛЕ'інфо 2017 – ст.38 - 42).

Починаючи з фази 31 **необхідно працювати фунгіцидами** проти борошнистої роси і септоріозу.

ОЗИМИЙ РІПАК

Пізні сходи ріпаку восени призвели до **загибелі посівів на багатьох площах.**

Для посіві, які нормально пройшли осінньо-зимовий період наступив **крайній термін для повної дози підживлення азотом.**

Період боротьби з бур'янами уже закінчений.

Також необхідно **слідкувати за появою на посівах квіткоїда і прихованохоботника** (жовті чашки).

Перед початком цвітіння потрібно **провести обробку системним інсектицидом** для того, щоб знизити популяцію шкідників, коли ріпак зацвіте.
Для додаткового підвищення потенціалу разом з системним інсектицидом потрібно внести 1,5 л/га **Уніфлор Б**, або 1 - 1,5 л/га **Уніфлор БМо**.

На початку цвітіння слід **провести обробку фунгіцидами** проти склеротинії і сірої гнилі, наприклад, - **Піктором**, **Тілмором, Пропульсом** та ін.