

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ 4-2020

КУКУРУДЗА

Цьогоріч склалися дуже сприятливі умови для посіву кукурудзи, але після закінчення посівної кампанії та отримання перших сходів розпочалося зниження температур, яке супроводжувалося нічними заморозками і сильними холодними вітрами. Далі розпочався період затяжних дощів і усі ці обставини призвели до значної затримки вегетації і не дали можливості вчасно провести обробку гербіцидами.

Зараз посіви кукурудзи майже по всіх регіонах знаходяться у фазі 3-5 листків. Після похолодання рослини кукурудзи набули фіолетового відтінку, що свідчить про недоступність фосфору.

Ми рекомендуємо внести рідкі фосфорні добрива для активізації кореневої системи до того часу, як рослина зможе сама засвоювати доступний фосфор із ґрунту.



ДЕФІЦИТ ФОСФОРУ



ДЕФІЦИТ ЦИНКУ

СИЛЬНО виражений дефіцит фосфору

СеріаСТАРТ® – 2 л/га

СЕРЕДНІЙ дефіцит фосфору і цинку

КорнСТАРТ® – 2-3 л/га

ДЕФІЦИТ ЦИНКУ

Спостерігається практично на усіх посівах кукурудзи

ЦинСТАРТ® – 2-3 л/га

БОРОТЬБА З БУР'ЯНАМИ

Через несприятливі погодні умови не всі господарства змогли обробити посіви ґрунтовими і страховими гербіцидами.

Тому зараз важливо пам'ятати про внесення страхових гербіцидів (особливо гормональних) до фази 4 листка!

Якщо з тих чи інших причин це внесення буде неможливим, то радимо після 5 листка внести **нікосульфурон** (проти злакових бур'янів), **мезотріон** або **темботріон** (проти дводольних бур'янів і падалиці соняшника).

Або використати інші продукти, які є дозволеними до використання на більш пізніх фазах розвитку кукурудзи.

Більше інформації
у додатку FARMi



App Store



Google Play