

4 КВІТНЯ 2018

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ №1

ПІЗНЯ ВЕСНА – відновлення вегетації – РІПАК та ОЗИМИ ЗЕРНОВІ

Восени минулого року склалися гарні умови для розвитку озимих культур, але пізня весна 2018 вносить свої корективи і скорочує вегетаційний період – **фази розвитку зернових культур будуть проходити швидше**. Тому потрібно слідкувати за технологічними строками виконання необхідних операцій.

На полях, де довго зберігався сніговий покрив, або там, де була льодова кірка – слідкувати за появою **снігової плісняви** і при потребі вносити **фунгіцид** та **високі стартові дози азотних добрив**.

ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

Запізнення з посівом ячменю складає вже більше 20 днів. Це негативно вплине на продуктивність кушення і скоротить вегетаційний період культури. Тому усі **заплановані норми азотних добрив** у формі NH_4NO_3 **потрібно внести до посіву**, щоб отримати швидкий старт сходів.

Крім того, важливо слідкувати за **глибиною загортання – 1,5 – 2,5 см**, щоб отримати однорідні сходи та уникнути конкуренції між рослинами на початкових етапах вегетації.

УВАГА!

Потрібно слідкувати за фізичною стиглістю ґрунту. Не варто сіяти у перезволожений ґрунт. Це призведе до слабого розвитку кореневої системи і зниження урожайності у разі недостатньої кількості опадів протягом наступних фаз вегетації.



Молоді рослини потрібно забезпечити **доступним фосфором**, щоб сприяти гарному утворенню кореневої системи. Це дозволить знизити вплив стресів під час високих температур і в умовах недостатнього зволоження.

Якщо фосфор не буде внесений при посіві – провести **листове підживлення фосфорними добривами разом з гербіцидом і першим фунгіцидом** у 21 та 29-30 фазах розвитку.


ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

За різних погодних умов і в різні роки **весняний вегетаційний період озимої пшениці** може тривати від 90 (при ранньому відновленні весняної вегетації) до 60 днів (при пізньому ВВВ). На даний момент вегетація відновилася вже в друге після морозів, які були в кінці березня.

Більшість посівів пшениці в гарному стані і досить добре розвинуті. Іноді можна зустріти по 2-3 продуктивних стебла. Фази розвитку коливаються від середини кушення до початку формування колоса.

Настав час для **внесення регулятора**, оскільки вже помітна закладка колоса над вузлом кушення.


Внести **хлормекват-хлорид** у нормі **0,7–1,5 л**. Слідкувати за розвитком бур'янів і за необхідності – **внести гербіциди**.



УВАГА!

Внести **азотні добрива**, щоб не пропустити фазу закладки кількості колосків у колосі.

Поперечний розріз рослини



При огляді посівів листя пшениці часто має фіолетовий відтінок, що свідчить про **нестачу елементів живлення**, через великі перепади температур. Бажано внести **листові добрива** з високим вмістом легкодоступного фосфору.

Наша рекомендація:

Внести добриво **СеріяСТАРТ**

- 1-1,5 л зараз
- 1,5-2 л через 5-10 днів



ОЗИМИЙ РІПАК

Ситуація на посівах в цілому позитивна. Фази розвитку коливаються від розетки 8-10 листків до фази склеєних бутонів.

Короткий період потепління у лютому-березні і подальше різке зниження температури спричинило певні пошкодження культури. Особливу увагу потрібно звернути на поля в горбистій місцевості і перерослі посіви (є випадки підмерзання).

Перше **внесення азотних добрив** уже виконано. Через 2-3 тижні при плануванні другого внесення необхідно скорегувати норму в залежності від оцінки наявних ушкоджень після приморозків (розрізати стебло і оглянути точку росту).

УВАГА!

На деяких господарствах було допущено помилку – внесено недостатню кількість регулятора росту восени при занадто інтенсивному наростанні вегетативної маси. Тому зараз при першій можливості потрібно внести росто-регулятор з фунгіцидною дією.




Звернути увагу на додаткове **підживлення позакореневими добривами**. Оскільки ґрунт ще холодний – спостерігається дефіцит поживних елементів, адже рослинам важко їх отримати.

До фази розвитку з'єднаних бутонів ріпак критично потребує **ФОСФОРУ**, який сприяє розвитку кореневої системи, а також – **БОРУ**, адже він запобігає розвитку гнилей і є ключовим елементом для формування репродуктивних органів рослини.

УВАГА!

Не плутати дефіцит бору з бактеріальними хворобами!




Внести добриво з вмістом **молібдену** для забезпечення урожаю більше 4 т/га: **+/- 10 г молібдену, особливо на ґрунтах із рН менше 6,5.**

Якщо з ряду причин на посівах ріпаку було **внесено сірку**, то потрібно використовувати **1,5-2 л/га сірки у формі SO₃**, додаючи її до кожного оприскування. Сірковмісні добрива перевіряти на сумісність з бором.

Вже зараз потрібно **розмістити на посівах жовті чашки** і спостерігати за появою **великого ріпакового прихованохоботника**.

Після потрапляння перших шкідників до пастки – **застосовувати інсектицид через 5-8 днів**.



ВІДНОВЛЕННЯ ВЕГЕТАЦІЇ – З'ЄДНАНІ БРУНЬКИ – ЦВІТІННЯ