

# УНІФЛОР В

FERTEQ



**БІОСТИМУЛЯТОР НА ОСНОВІ РОЗЧИНУ БОР-ЕТАНОЛАМІНУ ДЛЯ ГРУНТІВ ТА ЛИСТОВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН**

Продукт відповідає стандартам ЄС

**Номер реєстраційного посвідчення:** №07948, Серія А

**Увага:** перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини г/л
Бору (В), розчинного у воді	11 %	150 г/л



13,7 кг **10 л**

## ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ:

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату	Спосіб, час обробок, обмеження
Буряк	від 5 до 10 л/га	рослина на етапі появи 8-10 листків Ділиться на декілька внесень з інтервалом між ними в 15 днів
Ріпак	від 3 до 5 л/га	фаза 4-6 листків
Соняшник	від 3 до 5 л/га	рослина на етапі появи 6-8 пар листків
Виноград	4 внесення по 1 л/га	рослина на етапі відокремлення стовбів, появи квіткових бруньок, зав'язування плодів та початку періоду дозрівання
Фрукоти дерева	4 внесення по 1 л/га	1 внесення перед цвітінням, наступні внесення з 2-х тижневими інтервалами
Товарне садівництво або городництво	4 внесення по 2-3 л/га	добре розвинена поверхня листя Кожні 10-15 днів

**ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:** 1. Збовтайте обприскувача каністру перед використанням. 2. Наповніть цистей резервуар обприскувача на ¼ від його об'єму водою. 3. Додайте препарат в обприскувач. Якщо при обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин, інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових сумішей (від важкорозчинних до легкорозчинних). Порядок додавання продуктів у розчин по формуляціям: З.П.>В.Г.>К.С.>К.Е.>ад'юванти. Мікродобрива додаються останніми, за виключенням мікродобрив з кислотним рН (напр. Серіастарт), які можна додавати в обприскувач першими. 4. Змішуйте діючі суміші для обприскування не стане однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця обприскування.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:** Використовуйте на зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин. Уникайте обприскувань у найбільш спекотний період доби. При роботі з препаратом слід дотримуватися рекомендацій відносно ризиків та безпеки. Не застосовувати при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються). При роботі з продуктом використовувати гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту. Очистити все обладнання до та після використання.

**СУМІСНІСТЬ:** Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести біологічні випробування на сумісність або звернутись за консультацією до агрономічного відділу або регіональних представників ТОВ «Суффле Агро Україна».

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати у недоступному для дітей місці. Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів. Використовувати лише при необхідності та за рекомендаціями дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температур вище 30 °С.

**УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Допускається використання відкритих видів транспорних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватись з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

**УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ:** Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не викидайте в каналізацію або в навколишнє середовище. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкоднують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:** Відповідальність виробника полягає у забезпеченні препарату в герметичній упаковці, та пред'явленні рекомендацій щодо використання дозування для кожної культури. За будьякі ризики, пов'язані зі зберіганням, маніпулюванням та використанням продукції повну відповідальність несе споживач.

**ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ:** При потрапленні на шкіру або в очі промити чистою водою протягом декількох хвилин, за потреби звернутись до лікаря. При ускладненому диханні вийти (або вивести постраждалого) на свіже повітря і прийняти положення, яке полегшує дихання. При випадковому поглинанні препарату через ротову порожнину не викликати блювання, негайно звернутись до лікаря.

## ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

**Упаковка:** каністра 10 л

**Термін зберігання:** 24 місяці

**Дата виготовлення і номер партії:** вказані на упаковці

**Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика:**

IV клас небезпеки

**Виробник:** SDP, 1 rue Quesnay, 02000 LAON, France

Tel: +33(0)3 23 80 10 18 [www.s-d-p.fr](http://www.s-d-p.fr)

**Імпортер та дистрибутор в Україні:** ТОВ «Суффле Агро Україна»,

вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н,

Хмельницька обл., 30068, [www.souffle-agro.com.ua](http://www.souffle-agro.com.ua).

тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62

