

17 ТРАВНЯ 2016

ПОВІДОМЛЕННЯ З АГРОНОМІЇ

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

Фази розвитку пшениці коливаються між виходом прапорцевого листка та сформованим прапорцевим листком. Теперішні погодні умови, інтенсивні дощі та помірні температури, сприяють наростанню біомаси, що підвищує ризик вилягання.

У такому випадку,

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

Внести якнайшвидше Церон 0,2 – 0,6 Л/га для укріплення стебла.



АЗОТ

При потребі внести азот скориставшись дощовою погодою. Це внесення дозволить збільшити врожайність, кількість білку, та не спровокує вилягання.

ІНСЕКТИЦИДИ

Нами було помічено Черемхову попелицю та Злакову попелицю. Наглядати за полями та при потребі вносити інсектициди

ФУНГІЦИДИ

Висока гідрометрія та дощі є стимулюючими факторами для розвитку хвороб, наразі спостерігається ураження Септоріозом. Дощ дозволяє спорам підніматись до верхніх листків.

Санітарний стан погіршується, терміново вносити другий фунгіцид. (див. Суффле Інфо).



soufflet
agro ukraine

ТОВ „Суффле Агро Україна“

вул. Острозька, 138, м. Славута, Хмельницька обл., 30000 e-mail: sau@soufflet-group.com www.soufflet-agro.com.ua

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

НУТРИМАКС це позакореневе добриво, що містить в собі високу концентрацію сірки та азоту, що покращує фотосинтез та допомагає рослинам боротись зі стресом. За допомогою НУТРИМАКСу можна вирощувати високоякісну пшеницю підживлюючи рослини сіркою та азотом в критичний момент. Також створює «ефект озеленення», що і є результатом покращеного фотосинтезу.

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

Фази розвитку ячменю коливаються між початком виходу вусів та колосінням.

ФУНГІЦИДИ

Санітарний стан ячменю погіршується, необхідно без затримки застосовувати другий фунгіцид. (див. Суффле Інфо)

РЕГУЛЯТОРИ

У випадку небезпеки вилягання, перед виходом вусів, Церон 0,2 – 0,6 Л/га, для посилення стебла. Іншою перевагою цього внесення є зменшення втрат при збиранні через ламкість колоса.



ІНСЕКТИЦИДИ

Така ж сама відмітка що і для пшениці, було помічено колонії попелиці. Додати інсектицид до фунгіциду.



soufflet
agro ukraine

ТОВ „Суффле Агро Україна“

вул. Острозька, 138, м. Славути, Хмельницька обл., 30000 e-mail: sau@soufflet-group.com www.soufflet-agro.com.ua

ОЗИМИЙ РІПАК

Фаза середини цвітіння.

ФУНГІЦИДИ

При опаданні перших пелюсток повинен бути внесений перший фунгіцид для запобігання розвитку Склеротинії. Хвороба виникає у випадку опадання і приклеювання пелюсток до листя та стовбура. Наразі є максимальний ризик виникнення.

Підходить стадія внесення 2го фунгіциду – 10 перших стручків сформовані та наливаються (див. Суффле Інфо).

ІНСЕКТИЦИДИ

Є присутність Стручкового прихованохоботника.

Під час цвітіння Квідкоїд не є шкодочинним, а навпаки сприяє запиленню квітів.



ЯРИЙ ЯЧМІНЬ

Хороший вегетативний стан. Фази розвитку коливаються від кінця кущення до 2го міжвузля. В більшості випадків культури є загущеними.

ГЕРБІЦИДИ

Перший гербіцид вже повинен бути внесений.



soufflet
agro ukraine

ТОВ „Суффле Агро Україна“

вул. Острозька, 138, м. Славути, Хмельницька обл., 30000 e-mail: sau@soufflet-group.com www.soufflet-agro.com.ua

ФУНГІЦИДИ

Вище згадані погодні умови є сприятливими для розвитку хвороб листя. Внести перший фунгіцид для збереження хорошого вегетативного стану аж до виходу прапорцевого листка, де і має бути внесений 2й фунгіцид.

РЕГУЛЯТОРИ

У випадку потужного розвитку ячменю, вносити Терпал 1 – 1,5 Л/га або Модус 0,3 – 0,4 Л/га, починаючи від стадії 3-5 см (відстань від вузла кущення до колоса). Та передбачити внесення перед виходом вусів Церон 0,2 – 0,3 Л/га або Терпал 0,4 – 0,6 Л/га.

ІНСЕКТИЦИДИ

Є загроза ураження попелиці, спостерігати за посівами.



soufflet
agro ukraine

ТОВ „Суффле Агро Україна“

вул. Острозька, 138, м. Славута, Хмельницька обл., 30000 e-mail: sau@soufflet-group.com www.soufflet-agro.com.ua

ГОРОХ

ФУНГІЦИДИ та ІНСЕКТИЦИДИ

При високій вологості та температурі збільшується ризик захворювань та чисельність популяцій шкідників. Бажано внести фунгіцид та інсектицид.

(див. Суффле Інфо 2016).

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

До утворення квіткових бутонів Вносити Уніфлор БМо 1- 2л/га. Для активізації роботи бульбочкових бактерій та покращення цвітіння.

СОНЯШНИК

ФУНГІЦИДИ

Оскільки спостерігаються достатня кількість опадів, а Соняшник має спільні збудники хвороб з Ріпаком та Соєю, в залежності від ризику захворювання необхідно запланувати 1 – 2 фунгіцидні обробки. 1й – 1-6 листків, 2й – початок цвітіння. При плануванні 1го внесення фунгіциду, бажано його відтягнути якнайближче до початку цвітіння.

(див. Суффле Інфо).

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

До початку утворення зірочки необхідно вносити Уніфлор Б або БМо, що впливає на формування генеративних органів. (див. Суффле Інфо).



soufflet
agro ukraine

КУКУРУДЗА

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

Так як кукурудза є особливо чутливою до нестачі Цинку, рекомендується вносити добрива що містять цей елемент живлення, починаючи від фази 4-5 листків, при виявленні нестачі. За низьких температур елементи живлення можуть бути недоступними для коренів рослини.

У випадку якщо не було внесено Азот, то до 8 го листка бажано підживити культуру.

ГЕРБІЦИДИ

Фаза 5 – 7 листків є критичною для внесення гербіцидів, при якій проходить формування початку (качана), до її настання бажано закінчити внесення гербіцидів, так само не дозволяючи бур'янам перерости.



СОЯ

ГЕРБІЦИДИ

Рекомендується завершити внесення страхових гербіцидів до 3го трійчатого листка.

(див. Суффле Інфо).



ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО
РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА:

ВІКТОР ЮЩУК

регіональний представник у Тернопільській обл.

+38 (050) 376-77-37
vyuschuk@soufflet.com

ВІТАЛІЙ ГРИЦІВ

регіональний представник у Хмельницькій обл.
/південь/

+38 (050) 436-07-09
vgrytsiv@soufflet.com

МИКОЛА ДЗЮМАК

регіональний представник у Житомирській та
Хмельницькій обл. /північ/

+38 (050) 376-27-68
mdzyumak@soufflet.com

ВІКТОР ВАРХОЛЯК

регіональний представник у Вінницькій обл.

+38 (050) 461-27-99
vvarkholyak@soufflet.com

ВІТАЛІЙ МОРОЗ

регіональний представник у Київській обл.

+38 (050) 376-38-24
vmoroz@soufflet.com

ЄВГЕНІЙ ЩИПИЛОВ

регіональний представник у Черкаській обл.

+38 (050) 376-38-17
eschipilov@soufflet.com

ВІКТОР ЯРМОЛЬЧУК

регіональний представник у Львівській, Волинській і
Рівненській обл.

+38 (050) 376 09 55
vyarmolchuk@soufflet.com

МИКОЛА МАТВІЙЧУК

менеджер з постачання насіння
регіональний представник у Львівській, Волинській і
Рівненській обл.

+38 (050) 376 27 71
mmatviychuk@soufflet.com



soufflet
agro ukraine