



Діабло

ІНСЕКТО-АКАРИЦИД КОНТАКТНО-КИШКОВОЇ ДІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ▶ Має яскраво виражений репелентний ефект
- ▶ Стійкий до змивання дощем
- ▶ Ефективний на всіх стадіях розвитку комах
- ▶ Діє відразу після обробки і має виражену пролонговану дію
- ▶ Високоєфективний проти абсолютної більшості комах-шкідників, у т.ч. павутинного кліща
- ▶ Має широкий спектр дії і дозволяє використовувати низьку норму витрати
- ▶ Безпечний для сільськогосподарських культур

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 100 г/л – біфентрин
ФОРМУЛЯЦІЯ: Концентрат суспензії (SC)
УПАКОВКА: 1 л

БІФЕНТРИН:

- ▶ Діє на шкідливі організми контактно і кишково.
- ▶ Як і інші піретроїди – впливає на нервову систему.
- ▶ Ефективно діє на всі інші стадії розвитку комах: яйця, гусінь (німфи) та імаго.

Симптоми ураження: сильне збудження шкідника з подальшим паралічем.



Павутинний Кліщ



Чортополохівка (реп'яшниця)



Попелиця зелена яблунева



Пшеничний трипс



Хрестоцвітні блішки



Озима совка

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- ▶ Використовувати для оприскування культур при появі шкідників протягом періоду вегетації.
- ▶ Максимальна ефективність препарату досягається за умови обробки у вечірні або ранкові години при температурі від +15°C до +22°C.
- ▶ Для досягнення рівномірного та достатнього оприскування надземної частини культури рекомендованого додавати адювант рНАД у нормі 0,2-0,4 л/га.
- ▶ Рекомендовано використовувати дрібно-крапельні форсунки.
- ▶ Препарат сумісний з багатьма речовинами, крім лужних.

УВАГА: останню обробку продуктом проводити не пізніше, як за 30 днів до збирання врожаю.

Культура	Шкідник	Максимальна кратність обробок	Доза
Соя	Акацієва вогнівка, совки, кліщі	2	0,2-0,3 л/га
Яблуня	Яблунева плоджерка, мінуючі молі, листовітки, попелиці, кліщі	2	0,4-0,5 л/га
Виноградники	Кліщі	2	0,125-0,15 л/га

Культура	Фаза внесення	Доза
Пшениця*	ВВСН 21-69	0,25-0,4 л/га
Ячмінь*	ВВСН 21-69	0,2-0,3 л/га
Ріпак*	ВВСН 12-69	0,2-0,3 л/га
Соняшник*	ВВСН 10-79	0,15-0,25 л/га
Кукурудза*	ВВСН 12-71	0,15-0,25 л/га
Соя*	ВВСН 12-81	0,2-0,4 л/га
Цукровий буряк*	ВВСН 18-49	0,2-0,4 л/га
Горох*	ВВСН 12-89	0,2-0,4 л/га

* Світовий досвід використання аналогічних діючих речовин. Продукт не зареєстрований для цієї культури.