

# НітроТОП

FERTEQ



ЛИСТОВЕ ДОБРИВО НА ОСНОВІ АЗОТУ У ПОЄДНАННІ З СІРКОЮ ТА МАГНІЄМ, ЯКЕ ОПТИМІЗУЄ ВМІСТ БІЛКА У ЗЕРНІ, ПОКРАЩУЄ ЯКІСТЬ УРОЖАЮ ТА МАЄ ПРОЛОНГОВАНУ ДІЮ ЗА РАХУНОК АЗОТУ У ДВОХ РІЗНИХ ФОРМАХ

Продукт відповідає стандартам ЄС

Номер реєстраційного посвідчення: №04455, Серія Б

Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація, %	Вміст елементів, г/л
Загальний азот (N) 15,4% амідний, 7,7% азот з формальдегідом-сечовини	23,1 %	300 г/л
Водорозчинний оксид магнію (MgO)	2,5 %	33 г/л
Водорозчинний триоксид сірки (SO <sub>3</sub> )	5,2 %	67 г/л



12,8 кг(kg)

10 л(L)

## РЕКОМЕНДАЦІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

Культура	Норма витрати препарату	Рекомендований об'єм води	Період обробки
<b>Листове підживлення:</b>			
Зернові	15–20 л/га	100 л мін.	Від прарощеного листка до цвітіння.
Кукурудза	15–20 л/га	200 л	Від 4–6 листків і через 10–15 днів, якщо є потреба
Картопля	10–20 л/га	200 л	Перед початком формування бульб і на початку стадії цвітіння.
Буряк	10–20 л/га	100 л мін.	На стадії 4–6 листків і через місяць, якщо є потреба.
Соняшник	15–20 л/га	100 л мін.	Від 5–6 пар листків до появи суцвіття.
Кормовий буряк	10–20 л/га	100 л мін.	Від 4–6 листків і через 1 місяць, якщо потрібно.
Хрестоцвіті	15–20 л/га	100 л мін.	Від 4–8 листків, потім на стадії (С1) і на стадії (D2). <ul style="list-style-type: none"><li>● Посилене підживлення – 2 внесення від стадії нерозкритих листків до цвітіння.</li><li>● Для покращення якості суццв – 2 внесення навколо лози з інтервалом у 15 днів.</li><li>● Після збирання: 1 внесення після збору урожаю і до початку опадання листків.</li></ul>
Виноград	5–10 л/га 20 л/га 5–10 л/га	200 л 200 л 200 л	<ul style="list-style-type: none"><li>● Азотна підтримка – 1 внесення до стадії цвітіння, або 1 внесення до початку цвітіння або після опадання листючок.</li><li>● Після збирання: 1 внесення після збору урожаю і перед початком опадання листя.</li></ul>
Фруктові дерева	5–10 л/га 5–10 л/га	500 л 500 л	

**ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ:** 1. Збовтайте каністру перед використанням. 2. Наповніть чистий резервуар обприскувача на  $\frac{3}{4}$  від його об'єму водою. 3. Додайте препарат в обприскувач. Якщо при обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин, інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових сумішей (від легкорозчинних до легкорозчинних). 4. Змішайте доки суміш для обприскування не стане однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця обприскування.

**РЕКОМЕНДАЦІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ:** Використовуйте на зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин. Уникайте обприскувань у найбільш спекотний період доби. При роботі з препаратом слід дотримуватися рекомендацій відносно ризиків та безпеки. Не застосовуйте при настаних екстремальних погодних умов (посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються). Не застосовуйте під час цвітіння. При роботі з продуктом використовувати гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту. Очистити все обладнання до та після використання.

**СУМІСНІСТЬ:** Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести біологічні випробування на сумісність або звернутися за консультацією до агрономічного відділу або регіональних представників ТОВ «Суффле Агро Україна».

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:** Зберігати у недоступному для дітей місці. Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів. Використовувати лише при необхідності та за рекомендованим дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температур вище 40 °C.

**УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ:** Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Дopusкається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватись з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

**УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ:** Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не викидайте в каналізацію або в навколишнє середовище. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:** Відповідальність виробника полягає у забезпеченні препарату в герметичній упаковці, та пред'явленні рекомендацій щодо використання дозування для кожної культури. За будь-які ризики, пов'язані зі зберіганням, маніпулюванням та використанням продукції повну відповідальність несе споживач.

**ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ:** При потрапленні на шкіру або в очі промити чистою водою протягом декількох хвилин, за потреби звернутися до лікаря. При укладенню диханні вийти (або вивести постраждалого) на свіже повітря і прийняти положення, яке полегшує дихання. При випадковому поглинанні препарату через ротову порожнину не викликати блювання, негайно звернутися до лікаря.

## ТІЛЬКІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

**Упаковка:** 10 л, 200 л, 600 л

**Термін зберігання:** 36 місяців

**Дата виготовлення і номер партії:** вказані на упаковці

**Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика:** IV клас небезпеки

**Виробник:** AGRONUTRITION, Parc Actinvestre-3 av de l'Orchidée,

31390 CARBONNE, France; тел.: +33 (0)561.978.500, www.agronutrition.com

**Імпортер та дистрибутор в Україні:** ТОВ «Суффле Агро Україна»,

вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н,

Хмельницька обл., 30068, www.souffle-agro.com.ua.

тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62

