

ОілСТАРТ

FERTEQ



КОМБІНОВАНЕ МІКРОДОБРИВО НА ОСНОВІ СІРКИ У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ПОТУЖНОГО ВЕСНЯНОГО ВІДНОВЛЕННЯ РІПАКУ, СТАРТУ СОНЯШНИКУ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ КУЛЬТУР

Продукт відповідає стандартам ЄС

Номер реєстраційного посвідчення: №05450 , Серія А

Увага: перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці

Для уникнення ризиків для людини та довкілля слід дотримуватись інструкції щодо використання.

Діюча речовина	Концентрація %	Вміст діючої речовини г/л
Бор (В), водорозчинний	1,92 %	27 г/л
Молібден (Мо) водорозчинний	0,214 %	3 г/л
Азот (N)	2,14 %	30 г/л
Магній (MgO)	2,14 %	30 г/л
Сірний ангідрид (SO ₃)	71 %	1000 г/л



13,85 кг **10 л**

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ:

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату	Спосіб, час обробки, обмеження
Пінак	3–5 л/га	максимальна концентрація: 3% стадії: 1 – 2 обробки, починаючи з 2 – 3 листків та перед цвітінням
Соняшник	3–5 л/га	максимальна концентрація: 3% стадії: 2 обробки в період 5 пар листків і потім - перед цвітінням
Буряк	3–5 л/га	максимальна концентрація: 3% стадії: 2 обробки по достатньо розвиненій листовій поверхні

ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ: 1. Збовтайте канистру перед використанням. 2. Наповніть чистий резервуар обприскувача на $\frac{3}{4}$ від його об'єму водою. 3. Додайте препарат в обприскувач. Якщо при обприскуванні застосовуються інші продукти (засоби захисту рослин, інші добрива), додайте продукти у порядку приготування бакових сумішей (від важкорозчинних до легкорозчинних). 4. Змішуйте доки суміш для обприскування не стане однорідною. 5. Продовжуйте змішування під час застосування, до кінця обприскування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ: Використовуйте на зазначених культурах протягом періоду активного росту рослин. Уникайте обприскувань у найбільш спекотний період доби. Не застосовувати у період цвітіння. При роботі з препаратом слід дотримуватися рекомендацій відносно ризиків та безпеки. Не застосовувати при настанні екстремальних погодних умов (посуха, приморозки, дощ або коли такі умови очікуються). При роботі з продуктом використовувати гумові рукавиці та індивідуальні засоби захисту. Очистити все обладнання до та після використання.

СУМІСНІСТЬ: Препарат сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив. Перед застосуванням бакових сумішей необхідно провести біологічні випробування на сумісність або звернутись за консультацією до агрономічного відділу або регіональних представників ТОВ «Суффле Агро Україна».

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у недоступному для дітей місці. Тримати закритим та якнайдалі від харчових продуктів. Використовувати лише при необхідності та за рекомендованим дозуванням. Зберігати препарат в оригінальній упаковці, у прохолодному сухому місці при постійній температурі. Уникати замерзання та температур вище 40 °C.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ: Транспортування можливе усіма видами транспорту в критих транспортних засобах. Допускається використання відкритих видів транспортних засобів, що забезпечують захист від атмосферних опадів. Транспортування має відбуватись з дотриманням вимог законодавства України щодо транспортування небезпечних речовин відповідного класу.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ: Утилізація відходів повинна здійснюватися відповідно до офіційних нормативних вимог. Не викидайте в каналізацію або в навколишнє середовище. Утилізуйте відходи відповідно до місцевих та/або національних норм. Тару знешкоджують відповідно до чинного законодавства на спеціалізованих підприємствах, що мають ліцензію на проведення таких робіт.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРНІВ: Відповідальність виробника полягає у забезпеченні препарату в герметичній упаковці, та пред'явлені рекомендації щодо використання дозування для кожної культури. За будь-якої ризику, пов'язані зі зберіганням, маніпулюванням та використанням продукції повну відповідальність несе споживач.

ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ: При потрапленні на шкіру або в очі промити чистою водою протягом декількох хвилин, за потреби звернутися до лікаря. При ускладненому диханні вийти (або вивести постраждалого) на свіже повітря і прийняти положення, яке полегшує дихання. При випадковому поглинанні препарату через ротovu порожнину не викликати блювання, негайно звернутися до лікаря.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Упаковка: канистра 10 л

Термін зберігання: 24 місяці

Дата виготовлення і номер партії: вказані на упаковці

Класифікація по ВООЗ, токсикологічна характеристика:
IV клас небезпеки

Виробник: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, France

тел.: +33 (0)561.978.500, www.agronutrition.com

Імпортер та дистрибутор в Україні:

ТОВ «Суффле Агро Україна», вул. Б. Хмельницького, 43, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068, www.soufflet-agro.com.ua.

тел. +38 050 436 70 11, +38 050 436 75 62

