



Кінкел

ГЕРБІЦИД ДЛЯ КУКУРУДЗИ З ЕФЕКТИВНИМ ПОЄДНАННЯМ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ▶ Оптимальний після-сходовий гербіцид для контролю більшості широколистих та злакових бур'янів
- ▶ Забезпечує підвищений рівень ефективності за рахунок поєднання нікосульфурону і дікамби, у порівнянні з використанням цих діючих речовин поодиночі
- ▶ Швидко абсорбується завдяки синергетичному ефекту двох різних діючих речовин, які проникають через кутикулу безпосередньо у листок і поширюються по меристемі
- ▶ Добрий партнер для змішування (рекомендовано змішувати з мезотріоном)

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 150 г/кг – нікосульфурон
600 г/кг - дікамба

ФОРМУЛЯЦІЯ: Водорозчинні гранули (ВГ)

УПАКОВКА: 1 кг

ДІКАМБА:

- ▶ Проникає у бур'ян, як через листок, так і через корені, активно гальмує ріст і поділ клітин бур'янів, порушуючи у них білковий і ліпідний обмін, що призводить до їхньої загибелі.

Головним чинником у боротьбі проти багаторічних бур'янів є саме загибель кореневої системи.

НІКОСУЛЬФУРОН:

- ▶ Блокує фермент ацетолактатсинтазу (АЛС), який відіграє важливу роль у синтезі амінокислот. У результаті цього уповільнюється поділ клітин і гальмується подальший ріст бур'янів.


- ▶ З метою забезпечення найкращого результату рекомендуємо застосовувати продукт під час активного росту бур'янів та відповідних умов гідрометрії – вітру і температури.
- ▶ Теплі та вологі умови після застосування гарантують загибель бур'янів. Сухі умови можуть знизити ефективність внесення.

Для забезпечення найкращого ефекту Кінкел радимо завжди змішувати його з відповідним адьювантом, який покращує проникнення діючої речовини у тканини рослин. Наприклад, адьювантом ОілАД^{плюс} у нормі 0,5 л/га (при об'ємі води від 100 до 200 л/га).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ:

Культура	Фаза внесення	Кількість внесення	Доза
Кукурудза	ВВСН 12-15		0,25-0,4 кг/га





Кінкел 0,25-0,4 кг/га	+	ОілАД ^{ПЛЮС} 0,5 л/га		
Кінкел 0,25-0,4 кг/га	+	ОілАД ^{ПЛЮС} 0,5 л/га	+	мезотріон



Не застосовувати у проміжку між фазами 6-8 листків кукурудзи через ризик фітотоксичності дікамби під час програмування качана

Злакові бур'яни	Кінкел + ОілАД ^{плюс}
Кураче просо	ефективність 95-100%
Пирій	ефективність 95-100%
Вівсюг	ефективність 95-100%
Зернова падалиця	ефективність 95-100%
Мишій (види)	ефективність 95-100%

Дводольні бур'яни	Кінкел + ОілАД ^{плюс}
Підмаренник чіпкий	ефективність 70-84%
Гірчак (види)	ефективність 95-100%
Спориш (види)	ефективність 70-84%
Щириця звичайна	ефективність 95-100%
Лобода	ефективність 95-100%
Паслін чорний	ефективність 50-69%
Ріпакова падалиця	ефективність 70-84%
Соняшникова падалиця*	ефективність 70-84%
Осот (види)	ефективність 85-94%
Кучерявець Софії	ефективність 85-94%
Талабан польовий	ефективність 85-94%
Галінсога	ефективність 95-100%
Буркун	ефективність 95-100%
Грицики	ефективність 95-100%

* Для кращої ефективності рекомендовано використовувати разом з мезотріоном.

